


**BUTLLETÍ N°2: Avís del dia 23 d'abril de 2015**
**Olivera, vinya, ametller, noguer, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins**
**OLIVERA: Repilo "ull de gall":**

Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Es recorda que a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, com taques a les fulles, i amb elevada humitat ambiental cal mantenir protegida la nova brotada des de l'inici (oxiclorur de coure o similar). Mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

**VINYA: Corc del raïm. Confusió sexual**

En les zones de confusió sexual s'han de tenir present les següents recomanacions:

- Els difusors han de col·locar-se just a l'inici de la primera generació, quan es produeixen les primeres captures.
- Cal fer superfícies àmplies (mínim 40 ha) i tancades (totes les vinyes dins de la zona han de fer confusió).
- Es tracta d'una tècnica de lluita col·lectiva, si un sol viticultor no pot assolir el mínim de superfície, cal que es posi d'acord amb els veïns.
- S'aconsella col·locar els difusors uniformement dins la parcel·la, posant sempre el nombre de difusors per hectàrea que recomana la casa.
- El nombre de ceps a deixar entre difusor i difusor dependrà del marc de plantació de la vinya i caldrà calcular-ho prèviament.
- Les vores de la zona de confusió s'han de reforçar, doblant el nombre de difusors.
- És necessari tenir supervisió tècnica per verificar el seu funcionament, principalment durant els primers anys.

Cal manipular els difusors amb guants ja que, tot i que no presenten toxicitat, poden ser irritants en contacte amb les mucoses.

**Cendrosa, Malura:** Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm. de longitud.

Es pot iniciar el tractament amb un producte tipus Massocur, Vivando o similar.

**Mildiu:** Aviat entrarà en funcionament la Xarxa d'Avís Antimíldiu al Penedès, a la resta de comarques o farà més tard.

De moment no es recomana realitzar cap tractament contra el mildiu, ja que la manca de pluges destacables durant el que portem de primavera, fa que el risc d'atac sigui nul.

**AMETLLER: pugó** A partir d'ara vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

**NOGUER: Bacteriosis i Antracnosi**

Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control de la bacteriosis i especialment en períodes de pluges:

**BAIX PENEDÈS**

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

**LA CONCA DE BARBERÀ**

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

**ALT CAMP**

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



-El primer s'ha de fer a obertura de borrons, esteu atents a les varietats mitjanes

-El segon tractament es realitza a l'inici de la floració femenina esteu atents a les varietats primerenques

Per controlar l'antracnosi cal iniciar la protecció a l'inici de la floració femenina amb fungicides orgànics, esteu atents a les varietats primerenques.

### PRESSEGUER I NECTARINA

- Trips:** Recordeu que només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina a caiguda de pètals.
- Pugó:** Cal vigilar si s'observen colònies de pugó a les brostades.
- Arrufat:** Vigileu si s'observen contaminacions a la brostada.
- Cendrosa:** Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins l'enduriment de pinyol.

### HORTA:

- Tomàquet:** Ja s'han detectat les primeres captures a l'aire lliure, cal estar atents.
- Tuta absoluta** Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.
- All i fava: Rovell** Vigileu les plantacions i en cas necessari tracteu.
- Enciam: Pugó** Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu abans del tancament del cabdell o de les pinyes, valorant que pot afectar els enemics naturals que tenen un paper important en el control d'aquesta plaga.
- Ceba i Enciam: Mildiu** Humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l'aparició aquesta malaltia, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.
- Col, coliflor i bròquil** Esteu atents a l'aparició de les primeres erugues

### PARCS i JARDINS

- Palmeres:Morrut** S'ha detectat el vol dels primers adults. A partir d'aquest moment no es pot podar. Per mantenir protegides las palmeres es recomana realitzar els tractaments segons el protocol que podeu trobar a la web del Departament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí  
 Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS  
 Telf. 685 10 85 68

#### BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

#### LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

#### ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10