


BUTLLETÍ N°8: ALT CAMP

Avís del dia: 23 de juliol de 2015

Cultius:

Vinya, olivera, noguer, fruiters de pinyol i horta

Vinya:

Cuc del Raïm: Tercera generació

ATENCIÓ: PER A ZONES SENSE FEROMONES

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

• **Camp de Tarragona:**

– **A la zona primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils, l'inici de l'eclosió és dimarts 21 i dimecres 22. La màxima eclosió serà divendres 24, dissabte 25, diumenge 26.

– **A les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls l'inici de l'eclosió és dimecres 22 i dijous 23. La màxima eclosió serà dissabte 25, diumenge 26 i dilluns 27. (CLORPIRIFOS)

– **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorenç, l'inici d'eclosió és dissabte 25 i diumenge 26. Amb clorpirifos esperar a propers avisos. Ara amb SPINOSAD, EMAMECTINA,TEBUFENOCIDE...

– **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra s'ha iniciat la posta dels ous.

BOTRITIS: amb el tractament del cuc del raïm es recomana realitzar un tractament antibotritis (tractar cara per cara) (Productes, CHORUS, PYRUS o similar).

Cendrosa: Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles. Cal protegir els raïms fins que l'enverat sigui complet (varietats negres) o fins que la maduració sigui clarament iniciada (varietats blanques).

Olivera:

Mosca de la oliva. *Bractocera oleae*

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en varietat arbequina.

Només s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones i varietats molt primerenques com sevillena, grossal, morruda etc per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si es supera el llindar del 5%.

Si s'utilitza la tècnica de la captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a partir d'aquest moment.

Noguer:

Carpocapsa

Estem en segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Aranya: Vigileu les plantacions i esteu atents a l'aparició dels primers símptomes.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Fruiters de pinyol:

Mosca de la fruita o ceratitis: Poblacions molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Monilia: Vigileu aquelles finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

Cendrosa en fulla: Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.

Grafolita: Recordeu que el lliendar de tractament és de: 15 adults/trampa/setmana, i que en cas de superar-lo, cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

Horta:

Horta en general

Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Cuc del tomàquet o Heliothis

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Cul negre

Amb l'augment de les temperatures s'està observant aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Mongeta

Aranya

Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona
 Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>
ssv.t.daam@gencat.cat

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí

Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS

Telf. 685 10 85 68

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10