

BUTLLETÍ GENERAL 5: PENEDÈS, ALT CAMP I CONCA DE BARBERÀ

Avís del dia 04 de juliol de 2018

Cultius:
Vinya, olivera, horta

Vinya

ZONES EN CONFUSIÓ SEXUAL, NO CAL TRACTAR

Cuc del Raïm: Segona generació

- **Baix Penedès:** ja s'han donat els avisos corresponents
- **Camp de Tarragona:** a les zones primerenques, mitjanes i tardanes, ja es va donar l'avís
 - **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de Santa Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra, la màxima eclosió és dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5.
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà, l'inici d'eclosió és dijous 5 i divendres 6.
 - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i zones baixes de Sarral estem en període posta.
 - **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat el vol.

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	Fenoxicarb
Entre inici de vol i inici d'eclosió	Cloraniliprol
	Indoxacarb
	Metoxifenocid
Inici d'eclosió	Bacillus thuringiensis (1)
	Emamectina (2)
	Spinosad (1)
	Spinetoram
	Tebufenocid
Màxima eclosió	Metil clorpirifos (2) (3)

Mildiu

S'estan trobant importants repicats de mildiu per molts indrets, recomanem vigilar atentament l'aparició de noves taques o de raïms afectats i en cas positiu cal tractar preferiblement amb productes penetrants o sistèmics, mullant el millor possible per les dues cares.

Cendrosa

Estem trobant incidència de cendrosa en molts indrets. Recordem que el tercer tractament cal fer-lo quan el gra del raïm arriba a la mida d'un pèsol.

NOTA: Per a obtenir bones eficàcies en tots els casos, els tractaments s'han de fer fila per fila, passant per les dues cares dels ceps

Olivera

Prays oleae

Ja s'ha donat l'avís per totes les zones.

Horta

Ceba i Patata: *Míldiu*

Vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

Tomaquera a l'aire lliure

Tuta absoluta

Les poblacions a l'aire lliure són molt baixes. Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els enemics naturals que colonitzen el cultiu de forma natural.

Acar del bronzejat

Amb l'augment de les temperatures va apareixent aquest àcar. Si localitzeu els primers focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Patata

Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.

ADV CELLERS DOMENYS, ASSOC.