

BUTLLETÍ N°13: 17 D'AGOST DE 2023 (CONCA DE BARBERÀ)

Avís 5/2023

Cultius:
Vinya, olivera
Vinya
Cuc del raïm (*Iobesia botrana*)
Moments de tractament i productes:

Els productes recomanats pel seu control tenen els següents moments d'aplicació:

Moment d'aplicació	Matèria activa	Producte – Casa comercial
Abans inici de vol	(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-acetat (feromona líquida)*	SUBVERT – Suterra Exployo vit - Syngenta
Entre inici de vol i inici eclosió	Clorrantraniliprol	CORAGEN - FMC
Inici d'eclosió	Bacillus thuringiensis **	Producte comú
	Spinetoram	RADIANT - Dow
	Spinosad **	SPINTOR – Dow TRACER – Dow
	Tebufenocide	MIMIC – Nisso

*: Cal aplicar abans de l'inici del vol de la 1a generació fins a la verema.

**: Autoritzat en agricultura ecològica

Alguns piretroids autoritzats en vinya, però no recomanats, per ser afavoridors d'àcars.

ZONA PRIMERENCA (3a Generació)


- Inici de vol: 24 de juliol
- Període de posta: 28 de juliol fins 4 d'agost
- Inici d'eclosió: 5 al 7 d'agost

ZONA MITJANA (3a Generació)

- Inici de vol: 26 de juliol
- Període de posta: 2 fins 9 d'agost
- Inici d'eclosió: 10 al 12 d'agost

ZONA TARDANA (3a Generació)

- Inici de vol: 31 d'agost
- Període de posta: 11 fins 17 d'agost
- Inici d'eclosió: 18 a 20 d'agost


ZONA CONFUSIÓ NO CAL TRACTAR



Cendrosa

Us recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra de raïm arriba a mida pèsol.

S'estan observats atacs en raïm. A partir del verol el risc de noves infeccions es redueix molt i només caldria renovar el tractament si trobeu danys. Recordeu que als 33°C el fong atura el seu creixement. Vigileu l'aplicació de sofre pols amb temperatures superiors als 30°C, pot produir cremats en raïm (fitotoxicitats).

Estratègies en ecològic per evitar cremats:

- VITISAN
Assecant d'hifes (parts colonitzadores del fong). No sobrepassar 8g/l en 1000 l d'aigua i mullar bé la vegetació.
- OLI DE TARONJA (PREVAM)
Si trobem miceli en raïm. Dosis estàndard 1,6 l/ha en 200 l/ha. Si apliquem amb temperatures altes concentrar 4 l de producte en 1000 l d'aigua.
- POLISULFUR DE CALÇ (CURATIO)
Efecte curatiu. No sobrepassar 8g/l en 1000 l d'aigua i mullar bé la vegetació.

Estratègies en convencional

Si necessiteu fer un tractament curatiu amb l'estratègia MEPTILDINOCAP + SISTÈMIC (KARATHANE + TRIAZOL) tingueu en compte el **termini de seguretat dels productes** a fi de poder entrar el raïm a celler. En aquest cas seria de 21 dies.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material per emparar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10