

BUTLLETÍ Nº6: 17 DE MAIG DE 2024 (CONCA)

Avís 3/2024

Dades pluviomètriques campanya (octubre a maig)

Estació	Pluviometria (l/m2)	Estació	Pluviometria (l/m2)
Sant Jaume	185,4	Rodonyà	185,1
Bisbal	222,6	Vila-rodona	193,1
Castellví	218,7	Blancafort	178,4
Vendrell	236,9	Pira	191,6

Cultius:

Vinya, olivera

Vinya

Mildiu

S'ha confirmat la primera taca, i està pendent de confirmació la segona, del Camp de Tarragona.

En els darrers dies s'han tornat a produir pluges de més de 10 litres al Camp de Tarragona i al Baix Penedès, i estem pendents de l'aparició de taques derivades de les pluges del 29 d'abril a la resta de zones, estigueu atents.

Us recordem que la detecció d'aquestes primeres taques es de gran importància en l'estratègia antimildiu i hi ha uns premis econòmics per qui localitzi la primera i la segona taca de cada comarca vitícola. En cas de detectar-les, recordeu avisar als tècnics d'ADV o a aquest servei sense arrencar-la del cep.

De moment no hem trobat cap taca a la comarca. Tot i que **el risc de mildiu ha augmentat** no ens trobem en un estat fenològic sensible i de moment no recomanem un tractament general. Durant finals de la setmana vinent es preveu l'inici de floració a les zones i varietats més primerenques i **recomanarem un tractament preventiu a mesura que vagi arribant aquest estat fenològic sensible**. Esteu atents als propers avisos.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-15 cm de longitud. En finques i varietats sensibles, es pot repetir el tractament als 15 dies.

Hem trobat danys de malura en fulla vella i inflorescències de varietats sensibles. En varietats més endarrerides es pot optar per **renovar la protecció 2-3 setmanes** després del darrer tractament. Tingueu en compte no repetir matèries actives en tractaments successius per evitar l'aparició de resistències del fong davant determinats productes fitosanitaris d'acció sistèmica com els triazols.

Recomanem utilitzar mullants si feu servir productes de contacte per reduir el rentat del producte i augmentar la persistència del producte.

DANYS CINEGÈTICS (CABIROLS)

Es recomana l'aplicació del producte Trico en finques susceptibles de danys per cabirol. Té número de registre ES-00771 i ha obtingut bons resultats en assaigs fets per Sanitat Vegetal Penedès l'any passat.

Per a més informació sobre metodologia d'aplicació, dosis, preu, consulteu al tècnic. Producte disponible a AgroDomenys.



De forma mecànica
en quad o difusors
laterals.

Com aplicar TRICO?



Amb polvoritzador manual i cep a cep:
permet diferenciar les parts protegides
de la resta i evitar confusions.

Olivera

Repilo o ull de gall (*Spilotea oleagina*)

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser beneficioses per aquest fong. En les zones més sensibles, on hi ha plantacions afectades es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.



Si no heu fet cap tractament us recomanem un tractament després de floració.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECORDATORIS

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2025**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material
per emparrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.