



BUTLLETÍ N°4: 29 D'ABRIL DE 2020 (CONCA DE BARBERÀ)

Avís 3/2020

Cultius:

Vinya, ametller, olivera, horta

Vinya

Míldiu

Fins el moment no s'ha detectat l'aparició de cap taca de míldiu a les nostres comarques.

Vigilar l'aparició de les primeres taques és de gran importància per evitar danys de la malaltia. Es premiarà la primera i segona taca de cada comarca. En cas de detectar-ne, avisar als tècnics de les ADV o bé directament a aquest servei sense arrencar-la del cep.

Tenint en compte que no s'esperen pluges pels propers dies **ENCARA NO ES RECOMANA REALITZAR CAP TRACTAMENT CONTRA MILDIU**. Per tal de poder optimitzar el nombre de tractaments a realitzar durant la campanya és important que cal tractar sempre abans de les pluges, tant si fem servir productes de contacte, com sistèmics. De tota manera, esteu atens als missatges de l'ADV.

Cendrosa

A les zones i varietats primerenques ja s'està produint la brotada. Recordem que el primer tractament es recomana quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

La brotada de les varietats més primerenques està essent molt irregular en alguns indrets. Es recomana començar per les parcel·les més avançades i esperar si cal per les més tardanes.

Ametller

Vespeta de l'ametller (*Eurytoma amygdali*)

Ja s'han donat els avisos de tractament pel control dels adults.

Podeu trobar més informació al [full informatiu](#) a la web del DARP.

Brot sec o fusicocum

Durant els mesos de maig i juny, en cas d'altres humitats o pluges, s'han de protegir els ametllers

Taca ocre

Degut a les condicions actuals, es recomana protegir les varietats sensibles en aquelles finques on hi hagi presència d'inòcul.

Pugó

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.



Les matèries actives autoritzades són Lamba-cihalotrin i Spirotetramat. Més informació sobre la vespeta de l'atmeller:

<https://cellersdomenys.com/uploads/advs/penedes/61-penedes.pdf>

Olivera:

Repilo o Ull de gall

En cas de mullenes als arbres, principalment en les zones més humides, es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment on es detecti la presència del fong.

Caparreta negra (*Saissetia oleae*)

La caparreta negra produeix danys directes alimentant-se de la saba, i danys indirectes al segregar melassa que causa l'aparició de negreta. No acostuma a ser una plaga problemàtica, però en el cas de tenir una afectació greu es pot fer el tractament.

Corc negre (*Hylesinus toranio*)

Aquesta plaga s'està estenent arreu del territori, cal vigilar la presència de brancatge sec. Per reduir la població és molt important aprofitar l'esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada.

Horta

Tomaquera a l'aire lliure

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trampes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement.

Tomàquet d'hivernacle

Tuta absoluta

Recordeu que la introducció de miríds depredadors ens pot fer un bon control de la plaga, a més a més d'ajudar-nos a controlar la mosca blanca que comença a estar present en alguns hivernacles. L'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions.

Míldiu

S'està detectant als hivernacles, vigileu les vostre plantacions.

Enciam, Ceba i Patata

Míldiu

En cas de produir-se humitats, cal vigilar les plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits.



Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECORDATORIS

- La matèria activa **METIL-CLORPIRIFOS** caduca el **16/4/20**. A partir d'aquesta data no està permesa la venda i l'ús del producte. Les matèries actives autoritzades durant la campanya seran:

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	Fenoxicarb
Entre inici de vol i inici d'eclosió	Clorantraniliprol
	Indoxacarb
	Metoxifenocide
Inici d'eclosió	<i>Bacillus thuringiensis</i> (1)
	Spinosad (1)
	Spinetoram
	Tebufenocide

La recomanació de tractament contra el corc del raïm quan disposàvem del metil-clorpirifos es produïa a partir del 10% de raïm afectats. La raó és que el ventall de dies per tractar amb màxima eclosió és més ampli que no pas altres moments del desenvolupament de l'insecte. La caiguda del metil-clorpirifos fa que s'hagi de **reduir el llistat de danys al 5% de raïm afectats** i, per tant, augmenti la possibilitat de recomanar els tractaments per segona i tercera generació per zones fora de confusió sexual amb feromones.

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2021**.
-

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material per emparar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CÒRCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10