


**BUTLLETÍ N°8: PENEDEès**

Avís del dia: 23 de juliol de 2015

Cultius:

**Vinya, olivera, noguer, fruiters de pinyol i horta**

**Vinya:**

**Cuc del Raïm: Tercera generació**

**ATENCIÓ: PER A ZONES SENSE FEROMONES**

**Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

- **Baix Penedès:**

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell l'inici de l'eclosió és dimarts 21 i dimecres 22. La màxima eclosió serà el divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 (CLORPIRIFOS)

- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres estem en el període de posta dels ous. La màxima eclosió es preveu pels dies 28,29 i 30 de juliol. A la zona de Cal Margarit i Castellví de la Marca realitzar el tractament els dies 30 i 31 de juliol.

**BOTRITIS:** amb el tractament del cuc del raïm es recomana realitzar un tractament antibotritis (tractar cara per cara) (Productes, CHORUS, PYRUS o similar).

**Cendrosa:** Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles. Cal protegir els raïms fins que l'enverat sigui complet (varietats negres) o fins que la maduració sigui clarament iniciada (varietats blanques).

**Olivera:**
**Mosca de la oliva. *Bractocera oleae***

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en varietat arbequina.

Només s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones i varietats molt primerenques com sevillena, grossal, morruda etc per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si es supera el llindar del 5%.

Si s'utilitza la tècnica de la captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a partir d'aquest moment.

**Noguer:**
**Carpocapsa**

Estem en segona generació. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

**Aranya:** Vigileu les plantacions i esteu atents a l'aparició dels primers símptomes.

**Fruiters de pinyol:**

**Mosca de la fruita o ceratitis:** Poblacions molt elevades. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

**Monilia:** Vigileu aquelles finques on hi hagi inòcul (fruits momificats).

**BAIX PENEDEès**

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

**LA CONCA DE BARBERÀ**

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

**ALT CAMP**

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



**Cendrosa en fulla:** Estem trobant plantacions joves de presseguer amb afectació, esteu atents.

**Grafolita:** Recordeu que el llinard de tractament és de: 15 adults/trampa/setmana, i que en cas de superar-lo, cal protegir els fruits des del verolat fins a la collita.

## Horta:

### Horta en general

#### Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

#### Tomàquet

##### **Tuta absoluta**

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

##### **Cuc del tomàquet o Heliothis**

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

##### **Cul negre**

Amb l'augment de les temperatures s'està observant aquesta fisiopatia. Es recomana realitzar regs freqüents i poc abundants.

##### **Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)**

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

## Mongeta

#### **Aranya**

Vigileu la seva presència i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona  
 Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Enllaços d'interès:

Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres

Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris

**Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)**

**Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45**

<http://www.gencat.cat/daam>

[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí

Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS

Telf. 685 10 85 68

#### BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

#### LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

#### ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10