


BUTLLETÍ Nº3: Avís del dia 10 de maig de 2018
Cultius:
Vinya, cirerer, olivera, avellaner, ametller, noguer, presseguer i nectarina i horta
Vinya
Mildiu

Els continus períodes de pluges que estem tenint i les previsions de que continuïn els propers dies, donen un perill potencial important per aquesta malaltia. Aquesta situació enguany s'agreuja al produir-se abans de la floració, per tant i de manera preventiva, creiem aconsellable fer un tractament general. Al ser un període de fort creixement vegetatiu, ara és preferible utilitzar productes sistèmics que no son rentats per les pluges i que protegiran el que creixi després del tractament.

Recordem que cal estar molt atents a l'aparició de taques, de les que es premiarà econòmicament la primera i segona de cada comarca. En cas afirmatiu cal avisar immediatament a aquest servei o al tècnic de l'ADV que correspongui sense arrencar del cep la part afectada.

Cendrosa

Els tractaments preventius per a protegir els estats fenològics especialment sensibles a la malaltia, son molt importants. El primer d'ells és quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

Cirerer
Drosophila suzukii

Les captures als punts de control estan augmentant i s'han trobat els primers danys en la cirera més primerenca. Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Olivera
Repilo o ull de gall

Les condicions d'humitat i temperatura son adequades per al seu desenvolupament. Es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment on es detecti la presència del fong.

Corc (*Hylesinus toranio*)

Especialment a la comarca del Baix Camp, la zona d'oliveres més afectada per aquesta plaga, cal vigilar la presència de branques seques. En cas positiu és molt important aprofitar l'esporga per fer una neteja traient i cremant tots els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sota de la part afectada.

Avellaner
Pugó
BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça dels Arbres, 11 · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Vigileu la presència de pugó al revers de les fulles. En cas d'intervenir utilitzeu productes respectuosos amb els àcars fitoseids per evitar desequilibris d'aranya.

Ametller

Brot sec o fusicocum

Degut a les condicions climàtiques actuals, amb alta humitat i dies de pluja, es recomana iniciar la protecció de les varietats sensibles a les finques on tradicionalment hi ha afectació de la malaltia.

Pugó

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

Noguer

Carpocapsa

A les finques on s'utilitzi la tècnica de la confusió sexual cal instal·lar els difusors.

Bacteriosis

Recordeu que el tercer tractament s'ha de fer a quallat del fruit.

Antracnosis

El segon tractament al quallat del fruit i el tercer quinze dies més tard.

Presseguer i nectarina:

Trips

Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina a caiguda de pètals.

Pugó verd

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brostades.

Cendrosa

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins enduriment de pinyol.

Horta

Ceba: *Míldiu* i *Stemphilium* i Enciam i Patata: *Míldiu*

Les condicions actuals de pluges, humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Horta en general

Pugó

Estan augmentant les poblacions de pugó, cal vigilar les plantacions.



Tomaquera d'hivernacle

Tuta absoluta

Hi ha poblacions de Tuta als hivernacles. La col·locació de trampes amb feromones sexuals ens ajuden a detectar-ne la presència.

Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Mosca blanca

Va apareixent mosca blanca als hivernacles. Recordeu que s'ha detectat l'aparició de resistències a diferents productes fitosanitaris.

Una bona alternativa a la utilització de fitosanitaris, és la inoculació de mírids depredadors, com *Macrolophus pygmaeus*, que pot controlar aquesta plaga, així com reduir molt les poblacions de *Tuta absoluta*. Si s'utilitza aquesta tècnica, per a que sigui eficaç, és imprescindible l'assessorament tècnic per tal d'aplicar-la correctament i en el moment idoni.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

RECOMANACIÓ IMPORTANT:

S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem.

Ja s'accepten encàrrecs per a plantar el **2019**.

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.
ADV CELLERS DOMENYS, ASSOC.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça dels Arbres, 11 · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonà · 977 62 80 10

