


BUTLLETÍ N°1: 12 D'ABRIL DE 2022 (PENEDÈS I ALT CAMP)

Avís 1/2022

Cultius:
Vinya, olivera, ametller
Vinya
Corc del raïm (*Lobesia botrana*). Confusió sexual

Us recordem que, en aquelles zones on s'utilitzi la confusió sexual, s'han de col·locar els difusors.

Per a què la tècnica de la confusió sexual funcioni els difusors s'han de col·locar a camp abans de la detecció del vol de la primera generació, cosa que es va produir fa 2 setmanes. Si encara no les heu col·locat us aconsellem fer-ho el més aviat possible.

Productes registrats i comercialitzats per a confusió sexual.

Nom comercial	Titular	Dosi
BIOOtwIn L*	CBC	200 - 300 dif/ha
CHECKMATE PUFFER LB	SUTERRA	2,5 - 4 cab/ha
ISONET L	CBC	500 dif/ha
ISONET L TT	CBC	200 - 300 dif/ha
LOBETEC	SEDQ	400 dif/ha
QUANT LB PRO	BASF	350 - 500 dif/ha
SUBVERT**	SUTERRA	0,065 l/ha
CELADA LB 400	SUTERRA	200 dif/ha

*: Difusor biodegradable

** : Feromona líquida per aplicar en polvorització. No autoritzat en agricultura ecològica.

Cendrosa

A les zones i varietats primerenques ja s'està produint la brotada. Recordem que el primer tractament es recomana quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

Les varietats Chardonnay i Xarel·lo es troben en aquest estat fenològic. Comenceu per varietats i zones avançades.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Encara no es reuneixen les condicions per la germinació de les òspores d'hivern (combinació de 10 mm precipitació a, 10 °C temperatura mitjana i 10 cm de brotada) i no es recomana tractar-ne de moment.

Olivera

Repilo o ull de gall (*Spilocea oleagina*)

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser beneficioses per aquest fong. En les zones més sensibles, on hi ha plantacions afectades es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.



S'han trobat finques amb afectacions greus. Aquesta malaltia produeix defoliació i pèrdua de productivitat. Tracteu amb compostos cúprics.

Corc de l'olivera (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Per evitar afectacions d'aquesta plaga s'ha d'eliminar la fusta morta de la finca. Es recomana que quan s'hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o un picat fi (< 10 cm) d'aquestes o la seva crema en el mateix camp, i la llenya s'emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d'olivera.

Corc negre (*Hylesinus toranio*)

Per controlar aquesta plaga cal vigilar la presència de brancatge sec. Per reduir la població és molt important aprofitar l'esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada.

Les zones de La Bisbal i Vallformosa es varen trobar danys lleus l'any passat. Aproveiteu la poda per eliminar i cremar les branques amb danys. Si voleu més informació consulteu aquesta publicació:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/d ocuments_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf



Ametller

Vespeta de l'ametller (*Eurytoma amygdali*)



En els punts de control s'ha iniciat l'emergència dels adults.
Es recomana realitzar el primer tractament, a partir de dijous 14 d'abril.

Les matèries actives autoritzades són:

- Lamdacihalotrin (formulacions de 1,5%, 2,5% i 10%)
- Spirotetramat 10%
- Piretrines 4%
- Oli de parafina 79%

Pel control d'aquesta plaga serà necessari un segon tractament, continueu atents al contestador.

A la demarcació de Tarragona, està present a la Conca de Barberà i a l'Alt Camp a les zones limitrofes amb la Conca de Barberà. En cas de sospita de la plaga cal que ens ho comuniquem.

El tractament només es recomana a la comarca de Conca de Barberà i als municipis de Cabra del Camp, Figuerola i Valls.

Més informació sobre la vespeta de l'atmeller:

<https://cellersdomenys.com/uploads/advs/penedes/61-penedes.pdf>

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECORDATORIS

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2023**.
- **Campanya feromones 2022**. S'ha prorrogat un any més l'ajut de feromones (Ajut Sistemes Alternatius a la Lluita Química) sense poder afegir-ne més superfície.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material per emparrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10